

Očkovací kalendář



věk dítěte	Povinná hrazená očkování		Nepovinná hrazená očkování		Nepovinná nehrazená doporučená očkování	
	nemoc	očkovací látka	nemoc	očkovací látka	nemoc	očkovací látka
od 4. dne do 6. týdne	tuberkulóza (pouze u rizikových dětí s indikací)	BCG vaccine SSI				
od 6. týdne do nejpozději 24. týdne					rotavirové nákazy	Rotarix 2 dávky podávané ústy v odstupu 4 týdnů
od 9. týdne	záškrť, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná bakterií Haemophilus influenzae typu B	hexavakcína (Infanrix Hexa nebo Hexacima) 1. dávka	pneumokoková onemocnění meningokoková onemocnění séroskupiny B	Prevenar 20 1. dávka Bexsero 1. dávka		
3 měsíce			pneumokoková onemocnění	Prevenar 20 2. dávka		
4 měsíce	záškrť, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná bakterií Haemophilus influenzae typu B	hexavakcína (Infanrix Hexa nebo Hexacima) 2. dávka	pneumokoková onemocnění meningokoková onemocnění séroskupiny B	Prevenar 20 3. dávka Bexsero 2. dávka		
od 9 - 12 měsíců, ideálně před nástupem do kolektivu					plané neštovice	Varilrix / Varivax 2 dávky v odstupu 6 týdnů
12 měsíců	záškrť, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná bakterií Haemophilus influenzae typu B	hexavakcína (Infanrix Hexa nebo Hexacima) 3. dávka	pneumokoková onemocnění meningokoková onemocnění séroskupiny B	Prevenar 20 4. dávka Bexsero 3. dávka		
13 měsíců	spalničky, zarděnky, příušnice	M-M-RVAXPRO 1. dávka				
od 1 roku					žloutenka typu A	Havrix 2 dávky v odstupu 6 měsíců
					klíšťová encefalitida	FSME-IMMUN 1. 2 dávky v odstupu 1-3 měsíců, 3. dávka v odstupu 5-12 měsíců po 2. dávce, přeočkování každých 3-5 let
18 měsíců			meningokoková onemocnění séroskupin ACWY	Nimenrix 1 dávka		
od 2 let					chřipka	Fluenz Tetra / Influvac Tetra 1 dávka formou nosního spreje / intramuskulární injekce (dětí do 9 let, které nebyly dříve očkovány 2 dávkami)
5 let	záškrť, tetanus, černý kašel	Boostrix / Adacel (přeočkování)				
	spalničky, zarděnky, příušnice	M-M-RVAXPRO 2. dávka				
10 let	záškrť, tetanus, černý kašel, dětská obrna	Boostrix Polio / Adacel Polio (přeočkování)				
od 11 let do dovršení 15 let			onemocnění lidským papilomavirem (HPV)	Gardasil 9 2 dávky s odstupem 6 měsíců		
od 14 let do dovršení 16 let			meningokoková onemocnění séroskupiny B meningokoková onemocnění séroskupin ACWY	Trumenba 2 dávky s odstupem 6 měsíců Nimenrix 1 dávka		