Očkovací kalendář

věk dítěte	Povinná hrazená očkování		Nepovinná hrazená očkování		Nepovinná nehrazená doporučená očkování	
	nemoc	očkovací látka	nemoc	očkovací látka	nemoc	očkovací látka
novorozenci a kojenci během jejich první sezóny RSV			RSV	**Beyfortus** (monoklonální protilátka) 1 dávka		
od 4. dne do 6. týdne	tuberkulóza (pouze u rizikových dětí s indikací)	**BCG vaccine SSI**				
od 6. týdne do nejpozději 24. týdne					rotavirové nákazy	**Rotarix** 2 dávky podávané ústy v odstupu 4 týdnů
od 9. týdne	záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná bakterií Haemophilus influenzae typu B	hexavakcína (**Infanrix Hexa** nebo **Hexacima**) 1. dávka	pneumokoková onemocnění	**Prevenar 20** 1. dávka		
			meningokoková onemocnění séroskupiny B	**Bexsero** 1. dávka		
3 měsíce			pneumokoková onemocnění	**Prevenar 20** 2. dávka		
4 měsíce	záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná bakterií Haemophilus influenzae typu B	hexavakcína (**Infanrix Hexa** nebo **Hexacima**) 2. dávka	pneumokoková onemocnění	**Prevenar 20** 3. dávka		
			meningokoková onemocnění séroskupiny B	**Bexsero** 2. dávka		
od 6 měsíců			covid-19 (doporučeno pro děti s chron. onemocněním)	**Comirnaty** každoročně srpen - září	chřipka (doporučeno pro všechny)	**Fluenz** / **Influvac** 1 dávka formou nosního spreje / intramuskulární injekce (děti do 9 let, které nebyly dříve očkovány 2 dávky) každoročně září - říjen
od 9 měsíců					plané neštovice	**Varilrix** / **Varivax** 2 dávky v odstupu 6 týdnů
12 měsíců	záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná bakterií Haemophilus influenzae typu B	hexavakcína (**Infanrix Hexa** nebo **Hexacima**) 3. dávka	pneumokoková onemocnění	**Prevenar 20** 4. dávka		
			meningokoková onemocnění séroskupiny B	**Bexsero** 3. dávka		
mezi 1. a 2. rokem			meningokoková onemocnění séroskupin ACWY	**Nimenrix** 1 dávka		
13 měsíců	spalničky, zarděnky, příušnice	**M-M-RVAXPRO** 1. dávka				
od 1 roku					žloutenka typu A	**Havrix** 2 dávky v odstupu 6 měsíců
					klíšťová encefalitida	**FSME-IMMUN** 1. 2 dávky v odstupu 1-3 měsíců, 3. dávka v odstupu 5-12 měsíců po 2. dávce, přeočkování každých 3–5 let
5 let	záškrt, tetanus, černý kašel	**Boostrix** / **Adacel** (přeočkování)				
	spalničky, zarděnky, příušnice	**M-M-RVAXPRO** 2. dávka				
10 let	záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna	**Boostrix Polio** / **Adacel Polio** (přeočkování)				
od 11 let do dovršení 15 let			onemocnění lidským papilomavirem (HPV)	**Gardasil 9** 2 dávky s odstupem 6 měsíců		
od 14 let do dovršení 16 let			meningokoková onemocnění séroskupiny B	**Trumenba** 2 dávky s odstupem 6 měsíců		
			meningokoková onemocnění séroskupin ACWY	**Nimenrix** 1 dávka		